

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНСЬКОГО ХІРОПТЕРОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

Ігор Загороднюк¹, Василь Покиньчереда² та Володимир Домашлінець³

¹ Інститут зоології ім. Івана Шмальгаузена НАН України (Київ),

² Карпатський біосферний заповідник (Рахів),

³ Міністерство охорони навколошнього середовища та ядерної безпеки України (Київ)

Zagorodniuk I., Pokynchereda V., Domashlinets V. Activity and additional materials of the Ukrainian chiropterological centre. Brief communication about the creation of UCC and directions of our activity, initiatives in field investigations and training of new specialists, organization of the round tables in frameworks of the Annual Theriological school-seminar. Reviews and information materials prepared for the EUROBATS and Ministry of environment of Ukraine during 1996–1998 are presented, among them the reviews of the levels of abundance and protected categories of bats, bat migrations, bat ringing, etc.

Передісторія

У лютому 1995 року кілька груп теріологів з Ужгорода, Рахова, Львова та Києва зустрілись під час обліків зимових скupчень кажанів в одному з найбільших зимовищ – пічерній системі "Дружба". Активна спільна праця у ті морозні дні на лоні тотального замороження науки в оточуючому нас науковому середовищі вилилась у формування двох неформальних ініціатив – спелеобіологічної та хіраптерологічної асоціацій. Обидві включали активних членів Теріологічної школи, і на цій основі було домовлено про створення групи "Український хіраптерологічний центр", діяльність якої і полягала б у розгортанні хіраптерологічних ініціатив, проведенні польових навчань та круглих столів в рамках Теріологічної та Спелеобіологічної школі.

На цей час діяльність усіх наукових академічних товариств та відповідних великих всесоюзних і республіканських нарад та з'їздів була фактично зупинена. Натомість почали створюватись і діяти перші робочі групи і школи, які (на кшталт західних "воркшопів" та "нетворків") об'єднали зусилля "вузьких" фахівців відповідного профілю у вирішенні нагальних питань, одним з найголовніших серед яких стала проблема наукового забуття, необхідність збереження свого соціуму, обміну досвідом, спілкування, тощо.

Окрім цього, перед усіма нами посталася проблема узгодження досліджень з дослідженнями європейських колег, обміну досвіду у таких різноманітних галузях фахової діяльності, як облік кажанів з використанням ультразвукових детекторів та порівняння їх результатів з обліками у зимовищах, критерії визначення охоронних категорій та узгодження національних і міжнародних червоних списків, розробка національних програм щодо вивчення і збереження видів (Action plan) та законодавча підтримка цієї діяльності, підготовка визначників та популяризація знань¹.

Ініціативи УХЦ

За три роки своєї діяльності ініціативна група УХЦ:

- об'єднала фахівців-зоологів, що є активними учасниками усіх щорічних теріологічних та спелеобіологічних шкіл,
- налагодила робочі стосунки з EUROBATS (Бонн), Центром хіраптерологічної інформації (Краків), Мінекобезпеки України (Київ), Групою охорони кажанів (Словаччина),
- організувала щорічні моніторингові дослідження пічерних систем Карпатського регіону та стала активним членом робочої групи з проблеми "Кажани Карпатського регіону",
- спільно з польськими колегами організувала детекторні навчання на базі Карпатського заповідника (1996) та детекторні обліки кажанів у Закарпатті (1996), Прикарпатті (1997) та Києві (1997–1998);

¹ Результати деяких з цих діяльностей наводяться у цьому звіті або у подальших збірках у вигляді окремих повідомлень, дещо опубліковано раніше (Labocha et al., 1997; Покиньчереда 1997; Покиньчереда, Покиньчереда 1998; Покиньчереда ін., 1998; Загороднюк ін., 1997; 1998; Zagorodniuk, 1998а-б та багато інших; див. також цю збірку).

- прийняла активну участь у проведенні Першої (1997) та Другої (1998) Європейської ночі кажанів,
- організувала Круглий стіл з питань вивчення кажанів в рамках 3-ї (Нижинської), 4-ї (Поліської) та 5-ї (Зміївської) теріологічних шкіл,
- активізувала студентську молодь на підготовку курсових проектів (Міжнародний Соломонів університет) та організувала конкурс студентських та аспірантських праць з проблем вивчення кажанів,
- ініціювала відкриття цільової аспірантури при НАНУ з проблем охорони піщаних угруповань кажанів,
- підготувала визначники для діагностики кажанів за екстер'єрними і краніальними ознаками, які згідно з рішенням 2 сесії "EUROBATS", взято за основу для підготовки європейського визначника.

Черговим етапом нашої праці стала підготовка цієї збірки, від підготовки перших інформаційних листів та формування концепції і першої версії змісту до її реєстрації та видання.

Сезонні міграції кажанів на території України

Огляд-довідка, підготовлена УХЦ на запит Управління бюджетних ресурсів Мінекономіки України (Загороднюк, Покиньчереда, липень 1997) та доопрацьованазіскороченнями у травні 1998 р. спеціально для цієї збірки.

Через територію України проходять міграційні шляхи усіх перелітних видів кажанів Східної Європи загалом. Виразною осілістю виділяються лише місцеві популяції Криму та Закарпаття, більшість населення кажанів інших регіонів характеризується виразною міграційною активністю. В основі огляду – інформація, накопичена нами та наявна у статті Б. Попова (1941) та зведенні В. Абеленцева з Б. Поповим (1956), В. Абеленцева та ін. (1968–1970). Описи подано у систематичному порядку.

Підковоноси (*Phinolophus*). Два відносно рідкісні види, осідлі *Rhinolophus hippocastanum* – малочисельний осідлій вид, здійснює локальні міграції до місць зимівлі (піщаних угруповань). *Rhinolophus ferrumequinum* – чисельність менша, з роками скорочується осідлій, здійснює локальні міграції до зимовищ.

Довгокрильці (*Miniopterus shreibersi*). Єдиний рідкісний вид – *Miniopterus shreibersi* – колись чисельний вид, що зник фактично у нас на очах; перелітний, частково осідлій, на зимівлі залишається до 10–20 % літнього населення.

Нічниці великі (*Myotis s. str.*). Два відносно численні види. *Myotis blythi* та *Myotis myotis* – звичайні перелітні, частково осідлі види. Частина популяції з Українських Карпат мігрує на зиму за межі України.

Нічниці малі (*Myotis (Leuconoe s. l.)*). Найбагатша за видовим складом група. *Myotis bechsteinii* – дуже рідкісний вид України та Східних Карпат; осідлій, здійснює локальні міграції до місць зимівлі (піщаних угруповань). *Myotis nattereri* – дуже рідкісний осідлій вид, відомий в основному на зимівлі у піщаних угрупованях. *Myotis dasypus* – надзвичайно рідкісний перелітний, ймовірно, частково осідлій вид. *Myotis daubentonii* – звичайний, ймовірно, осідлій вид, здійснює локальні міграції до місць зимівлі (піщаних угруповань). *Myotis mystacinus* – малочисельний перелітний вид, в Українських Карпатах, ймовірно, осідлій (відомий на зимівлі в підземних сховищах). *Myotis emarginatus* – рідкісний осідлій вид, здійснює локальні міграції до місць зимівлі (піщаних угруповань).

Вухані (*Plecotus*). Обидва види цього роду є осідлими, характерні локальні міграції у пошуках інших місць зимівлі впродовж зими. *Plecotus auritus* – малочисельний осідлій вид, здійснює локальні міграції до місць зимівлі; ймовірно, частина популяції з північних областей України мігрує на зимівлі на південний схід. *Plecotus austriacus* – малочисельний осідлій вид, здійснює локальні міграції до місць зимівлі у Закарпатті – осідлій вид, відомий на зимівлі з підземних порожнин.

Широковухи (*Barbastella*). Представленій єдиним осідлим видом *Barbastella barbastellus* – осідлій вид, здійснює локальні міграції до місць зимівлі (піщаних угруповань). Відомий в Україні з півдня країни, здійснює локальні міграції у пошуках інших місць зимівлі.

Вечірниці (*Nyctalus*). У фауні України – три види, для всіх характерна зимівля більшої частини популяції за межами України. *Nyctalus leisleri* – надзвичайно рідкісний типовий перелітний вид, ймовірно, незначна частина популяції зимує у підземних сховищах (переважно дупла дерев) на південний схід України; переважна більшість особин мігрує за межі України. *Nyctalus noctula* – звичайний типовий перелітний вид; переважна частина популяції мігрує на зимівлю за межі України, в Закарпатті і, ймовірно, у інших південних областях України – осідлій. *Nyctalus lasiopterus* – рідкісний типовий перелітний вид, зимівлю у межах України не відомі, хоча ймовірні зими виключно у надземних сховищах.

Нетопири (*Pipistrellus*). Представленій чотирма видами, два з яких представлені маргінальними популяціями і включені до ЧКУ; ймовірно, всі види є перелітними. *Pipistrellus pipistrellus* – рідкісний перелітний вид; переважно зимує за межами України.

межами України; в Україні на зимівлі відомий у Закарпатті, ймовірна зимівля у Криму; на території України відомі знахідки на зимівлі у надземних сховищах, хоча відома зимівля цього виду у підземних порожнинах (Словаччина). *Pipistrellus nathusii* – рідкісний перелітний вид; переважно зимує за межами України; в Україні на зимівлі відомий тільки у Закарпатті, зимує у надземних сховищах. *Pipistrellus kuhli* – рідкісний південний вид, інформація щодо міграційної активності відсутня. *Pipistrellus sayii* – надзвичайно рідкісний вид, інформація щодо міграційної активності відсутня, поодинокі знахідки в Україні відносяться до північної межі видового ареалу.

Кажани (*Eptesicus*). Рід представлений двома осідлими видами. *Eptesicus serotinus* – чисельний осідлий вид, здійснює локальні міграції до місць зимівлі (надzemні сховища, рідше підземні); впродовж зими здійснює локальні міграції у пошуках інших місць зимівлі. *Eptesicus nilssoni* – рідкісний осідлий вид, здійснює локальні міграції до місць зимівлі (печер тощо); гірська частина популяції у Карпатах взимку мігрує на рівнину, зокрема за межі України (у підземних сховищах Український Карпат взимку не виявлений).

Лилики (*Vespertilio*). Представлений єдиним видом. *Vespertilio murinus* – рідкісний перелітний вид; ймовірно, в Українських Карпатах частково осідлий; відома єдина знахідка на зимівлі у межах України (гірська частина Закарпаття).

Кільцевання кажанів в Україні

Довідка, представлена у відповідь на запит "Eurobats", подається в оригінальному вигляді.

До цього варто додати, що головні підсумки кільцевання кажанів в Україні впродовж 1939–1967 pp. узагальнено у зведенні В. Абеленцева зі співавт. (1968–1970), результати аналізу кільцевання у Карпатському заповіднику, організованого та проведеного Я. Довганичем на початку 80-х, викладено у цій збірці (Покиньчереда, Довганич); наслідки кільцевання кажанів у Криму, опис чого анонсований А. Волохом у проекті цієї збірки, але так і не опубліковані; врешті, львів'яни планують розгорнути нову серію заходів щодо кільцевання кажанів (див. повідомлення І. Дикого з колегами).

Bat ringing in Ukraine [15.12.97; Zagorodniuk, Pokynchereda]:

Ringings of bats on territory of Ukraine were conducted during 1960–1985 years by separate researchers, without any centralized program. The ringings were carried out only using bird rings on bat forearm. The long-term experience testifies the negative influence of such approach on bats, up to their ruin. It was the main reason of the ending of the bat ringing in Ukraine.

The last ringing was carried out in the Carpathian Reserve in 1982–1985 years during bat wintering in caves. Since then, another attempts of bat ringing in Ukraine, as far as we know, were not carrying out.

We consider the ringing as one of main methods of study of bat population dynamics. In this connection we are interested in the resumption of the ringing on the basis of modern sparing techniques. We see a main directions in the cooperation with the European Center as (1) the coordination of such researches, and (2) development of a network of bat ringing in Ukraine.

We have some experience, desire and manpower. However, the most important and effective help from the Center could consist of the technical and information help, first of all the purchase of rings, most important speleo-equipment, elementary bat detectors and nets, organization of expeditions.

Порівняльна таблиця численності кажанів в Україні

Інформація "Comparative table of bat abundance in Ukraine" підготовлена для секретаріату EUROBATS (to Eric Blencowe; 6.02.98) з метою включення цих даних у нову версію зведеної таблиці стану популяцій та тенденцій зміни чисельності кажанів у країнах Європи. Такі дані узагальнено у наступній таблиці. Умовні позначення у таблиці:

Стовпчик "Status in RDBU" – охоронні категорії видів згідно з ЧКУ (1994) та пропоновані ("new") згідно з нашими оцінками історичних змін чисельності (за: Загороднюк, Ткач, 1996). Стовпчик "Eurobats review" – статус згідно з попереднім оглядом EUROBATS ("old") та нашими пропозиціями ("new"). Очевидно, що для більшості видів дати об'єктивні оцінки стану та динаміки чисельності неможлива.

Таблиця 1. Історичні зміни чисельності кажанів на території України (за даними зі: Загороднюк, Ткач, 1996) та формалізовані оцінки цих змін за схемою "Eurobats"

Рід та вид	Сума екз.	1900 1939		1940 1959		1960 1979		Status in RDBU (ЧКУ-94)	EUROBATS review	
		%	%	%	%	old	new		old	new
<i>Myotis nattereri</i>	1	0,0	0,2	0,0	3	o	?			
<i>Myotis dasycneme</i>	1	0,0	0,2	0,0	3	-	?			
<i>Myotis bechsteini</i>	2	0,0	0,2	0,5	3	o?	?			
<i>Pipistrellus savii</i>	2	0,0	0,2	0,5	3	?	?			
<i>Pipistrellus kuhli</i>	3	0,0	0,0	1,4	3	o	?			
<i>Plecotus austriacus</i>	4	0,3	0,5	0,0	-	o	o?			
<i>Eptesicus nilssoni</i>	4	0,3	0,2	0,9	-	-	-?			
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	5	0,9	0,3	0,0	3	-	?			
<i>Myotis emarginatus</i>	15	3,8	0,5	0,0	3	o?	?			
<i>Nyctalus leisleri</i>	18	4,7	0,3	0,5	3	-	?			
<i>Myotis mystacinus*</i>	20	3,8	0,4	2,8	-	o?	o?			
<i>Barbastella barbastellus</i>	25	0,0	2,8	3,7	3	-	o?			
<i>Myotis daubentonii</i>	31	1,6	2,0	6,5	-	o?	o			
<i>Vespertilio murinus</i>	27	6,3	1,0	0,5	-	o	o			
<i>Plecotus auritus</i>	37	1,6	2,6	7,5	-	o	o?			
<i>Pipistrellus nathusii</i>	44	1,9	5,3	2,8	-	o	o?			
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	55	1,9	4,1	11,2	2	-	o/+			
<i>Myotis myotis</i>	59	0,0	6,1	10,3	-	o	+			
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	62	5,0	5,8	5,1	-	o	o			
<i>Eptesicus serotinus</i>	91	6,9	6,5	14,0	-	-	o			
<i>Miniopterus schreibersi</i>	95	2,8	10,3	11,2	2	-	=			
<i>Myotis blythi</i>	170	12,8	18,5	7,9	-	+	+			
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	171	32,8	9,3	4,7	2	-	o			
<i>Nyctalus noctula</i>	196	12,8	22,8	7,9	-	-	o			

Примітка: * вкл. один колекційний екз. "*Myotis ikonnikovi*" з Закарпаття (див.: Zagorodniuk, 1998c)

Література

- Абеленцев В.І., Колюшев І.І., Крочко Ю.І., Татаринов К.А. Итоги кольцевания рукокрылых в Украинской ССР за 1939–1967 гг. Сообщ 1 // Вестн. зоологии – 1968, N 6. – С. 59–64. Сообщ 2 // Вестн. зоологии – 1969. – N 2. – С. 20–24. Сообщ 3 // Вестн. зоологии – 1970. – N 1. – С. 61–65.
- Абеленцев В. І., Попов Б. М. Ряд рукокрилі або кажани – Chiroptera /Фауна України – Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. – том 1: Ссавці, вип. 1. – С. 229–446.
- Дикий І., Сребродольська Є., Башта Т. Хіроптерологічні дослідження Львівщини: минуле і сучасне// Київ, 1998. – ця збірка
- Домашлінець В. Міжнародні правові аспекти охорони кажанів// Київ, 1998. – ця збірка
- Загороднюк І. Детекторні юблікі кажанів у Кисіві 1997–1998 років// Київ, 1998. – ця збірка
- Загороднюк І., Жила С., Киселюк О. Національна теріологічна школа-семінар «Ссавці у Червоній книзі» // Вестникзоології – 1998. – № 5. – (in press).
- Загороднюк І., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника- Київ: Ін-т зоол. НАНУ, 1997.- 60с. (Дод. 5 до "Вестн. зоологии").
- Загороднюк І., Ткач В. Сучасний стан фауни та історичні зміни чисельності кажанів (Chiroptera) на території України// Доповіді НАН України – 1996. – N 5. – С. 136–142.
- Покиньчереда В. Ф. Польовий визначник кажанів України – Рахів: вид-во Карпатськ зап-ка, 1997. – 22с.
- Покиньчереда В., Загороднюк І., Постава Т., Лабоха М., Таран В. Нічниця довговуха (*Myotis bechsteini*) та кажан північний(*Eptesicus nilssoni*) в Українських Карпатах// Вестн. зоологии – 1998, '6. – (in press).
- Покиньчереда В., Довганич Я. Кільцованиня рукокрилих в Карпатському заповіднику// Київ, 1998. – ця збірка
- Покиньчереда В., Довганич Я. Видовий склад та чисельність рукокрилих в зимівлі в окремих підземних порожнінах Карпатського біосферного заповідника // Міжнародні аспекти вивчення охорони біорізноманіття Карпат: Мат-ли міжнародної наук-практ. конф, присвяч 550-річчю м. Рахова 25–27 вересня 1997 р.– Рахів, 1997. – С. 154–157.
- Попов Б. М. О сезонних миграціях летучих хмішней // Природа – Москва 1941. – № 2. – С. 87–90.
- Labocha M., Pokynchedera V., Postawa T., Zagorodniuk Results of summer investigations of bats in the Carpathian biosphere reserve // Proc. 1st Intern. Conf. on the Carpathian bats- Krakow, 1997. – (in press).
- Zagorodniuk I. Bats in the Lviv Natural History Museum: description and comparative analysis of the collection //Наук зап. Львів. природознавчмуз. НАНУкраїни – 1998a.–14.– (in press).
- Zagorodniuk I. V. Taxonomy, biogeography and abundance of the Horseshoe bats (*Rhinolophidae*, Mammalia) from the Eastern Europe // Acta zoofracow. –1998b, 41. – (in press).
- Zagorodniuk I. V. Whiskered bats (*Myotis ex gr. mystacinus*) in Ukraine // Bats of the Carpathian region: Proc. 2nd Intern. Conf. – 1998c. – (in press).